

Informe Fitosanitario | Mildiu

Información periódica sobre el riesgo de Mildiu en viñedos

Las condiciones climáticas de esta campaña están marcando un inicio particular. Aunque las brotaciones se han retrasado ligeramente, los modelos de acumulación térmica ya reflejan un escenario de riesgo para la aparición de enfermedades fúngicas.

Para ayudarte a anticiparte y tomar decisiones informadas, lanzamos un **nuevo servicio totalmente gratuito de información periódica sobre el riesgo de mildiu**, basado en el **modelo predictivo de Goidanich** (para mildiu), integrando **datos en tiempo real procedentes de las estaciones agroclimáticas SIAR**.

De forma periódica, te ofreceremos un análisis detallado por zonas, con alertas y recomendaciones clave para proteger tus cultivos en el momento oportuno.



Rioja Baja

La semana pasada se detectaron infecciones primarias generalizadas de mildiu. No obstante, la evolución posterior está siendo lenta debido a las bajas temperaturas, a pesar de la elevada humedad registrada en los últimos días.

En Calahorra, la primera infección se produjo el 13 de abril, mientras que en Aldeanueva de Ebro, Alfaro y Rincón de Soto se registró el 16 de abril. Actualmente, el periodo de incubación se encuentra entre el 30% y el 40%.

Por ello, es importante estar preparados para aplicar los primeros tratamientos en cuanto se alcance un nivel de incubación del 70-80%. De este modo, evitaremos la formación de esporangióforos (estructuras que liberan esporas visibles en el envés de las hojas, detrás de las típicas “manchas de aceite”) y la aparición de infecciones secundarias.



Infecciones primarias detectadas:

Calahorra: **13 de abril**

Aldeanueva de Ebro, Alfaro, Rincón de Soto: **16 de abril**



Estado actual:

Incubación lenta (**30-40%**) por las bajas temperaturas, pese a la humedad.



Recomendación:

Preparar tratamientos cuando la incubación alcance el **70-80%**, para controlar focos y evitar infecciones secundarias

Rioja Media

A pesar de las lluvias generalizadas y los prolongados periodos de humectación foliar, las bajas temperaturas están limitando la aparición de infecciones primarias.

Hasta el momento, solo se ha registrado una posible infección primaria en Agoncillo, ocurrida el pasado 16 de abril.

Actualmente, esta se encontraría aproximadamente en un 35% del periodo de incubación.



Infecciones primarias detectadas:

Agoncillo: **16 de abril**



Estado actual:

Incubación en torno al **35%**



Condiciones generales:

Las bajas temperaturas están frenando las infecciones, a pesar de las lluvias constantes

Rioja Alta

Al igual que en La Rioja Media, las bajas temperaturas de esta primavera están retrasando la aparición de infecciones primarias de mildiu.

No obstante, el pasado 20 de abril se activaron las primeras alertas en San Vicente de la Sonsierra.

Según el modelo de incubación de Goidanich, estas posibles infecciones se encuentran aún en una fase muy inicial, con un 12% de desarrollo.



Infecciones primarias detectadas:

San Vicente de la Sonsierra: **20 de abril**



Estado actual:

Incubación muy inicial, en torno al **12%**



Recomendación:

Vigilancia activa y previsión de tratamientos si continúa la evolución

Anticípate al Mildiu esta campaña

Activa ya tus alertas fitosanitarias en Cesens®

Esta primavera, las condiciones climáticas están retrasando las infecciones primarias de mildiu, pero la **presión fitosanitaria será alta** debido a las infecciones otoñales persistentes y la elevada pluviometría acumulada.

NUESTRA RECOMENDACIÓN

Si ya eres **USUARIO CESENS®**



Activa las alertas de enfermedades y sigue las recomendaciones de nuestros modelos predictivos como Goidanich.



Un **control temprano** es clave para evitar la aparición de focos de infección y proteger la sanidad del cultivo durante toda la campaña.

Si todavía **NO** eres **USUARIO CESENS®**

Este año **no basta con reaccionar, hay que anticiparse.**



¿Aún trabajas con datos públicos? Las estaciones SIAR son útiles, pero su cobertura es limitada.



Con una **estación agroclimática propia**, recibirás alertas personalizadas, ajustadas al microclima exacto de tu parcela.



Invierte en control, gana en sanidad y rendimiento.

Contacta con nosotros para saber cómo implementar tu estación Cesens® y tomar decisiones basadas en datos reales.